

## ESPÈCES PROTÉGÉES

Céphalanthère rouge  
(*Cephalanthera rubra*),  
Céphalanthère  
à longues feuilles  
(*Cephalanthera longifolia*),  
Crépis en rosette  
(*Crepis praemorsa*),  
Sabot de Vénus  
(*Cypripedium calceolus*),  
Gentiane jaune  
(*Gentiana lutea*),  
Sorbier de Fontainebleau  
(*Sorbus latifolia*),  
Laser à feuilles larges  
(*Laserpitium latifolium*),  
Ronce des rochers  
(*Rubus saxatilis*).




Une hêtraie  
montagnarde  
à laïche blanche  
sur le Plateau  
de Langres.

Photo Alain CHIFFAUT

Les hêtraies sont les types forestiers à tendance montagnarde les plus fréquents en Champagne-Ardenne. On distingue les hêtraies calcicoles (plateaux calcaires et crayeux) et les hêtraies acidiphiles (Argonne, Ardenne primaire).

Parmi les hêtraies calcicoles, la hêtraie sèche des plateaux jurassiques haut-marnais et des Crêtes pré-ardennaises possède la flore la plus riche. L'essence dominante, le hêtre, est accompagnée de l'érable sycomore et de l'érable plane.

La note montagnarde est donnée par l'orme des montagnes, la ronce sans épines, la laïche blanche. Leurs lisières accueillent de nombreuses plantes rares comme le laser à larges feuilles et la gentiane jaune.



## SABOT DE VÉNUS

*Cypripedium calceolus*

Orchidacées



mai-juin



Photo Lionel KUTA

*Avec son grand labelle jaune et ses autres pièces florales brun-pourpre, le Sabot de Vénus ne peut être confondu avec aucune autre orchidée. Par contre, en dehors de la période de floraison, ses feuilles larges sont proches de celles de l'épipactis helleborine.*



Orchidée très convoitée, menacée par la cueillette et le déterrage.

Les défrichements des bois maigres ou les reboisements assortis d'un travail du sol sont désormais interdits dans ses principales stations.



20 à 50 cm

Cette magnifique orchidée pourrait être l'emblème de la région ou tout au moins de la Haute-Marne où sont concentrées toutes ses stations champenoises. Celles-ci comptent parmi les plus riches de la plaine française et un effort particulier de protection de leurs milieux de vie a été entrepris. Mais si beaucoup d'amateurs vont chaque année à la fin du mois de mai assister



Photo Vincent GILLET

respectueusement à la floraison de cette plante mythique, d'autres tentent encore de la ravir à ses sous-bois pour l'acclimater dans leur jardin ou alimenter un commerce. Aussi il appartient à nous tous, par notre comportement responsable, d'assurer l'avenir de ce joyau de la flore française et partant de l'ensemble de notre patrimoine naturel qu'il représente si bien.

*Le sabot de Vénus pousse souvent en petites colonies.*

RRR




Espèce rare en France où sa répartition est plutôt montagnarde. Moins de 20 stations en Champagne-Ardenne, toutes en Haute-Marne.



Lisières, forêts claires sur sols calcaires.



Les stations sont toutes protégées par des arrêtés de protection de biotope. Malgré cette protection réglementaire, la cueillette reste une menace.



R

Espèce à affinité montagnarde assez rare en France.  
Moins de 50 stations en Champagne-Ardenne.



Clairières sur sols calcaires peu épais, éboulis.



Orchidée relativement menacée par les défrichements de bois maigres, les reboisements et les entretiens drastiques des talus routiers.



Quelques stations sont protégées par l'arrêté de protection de biotope du Cul-du-Cerf (52) et par la réserve biologique communale du Val-Clavin (52).


 mai-juin


Photo Yves MARAIN

*Cette orchidée est aisée à reconnaître avec ses fleurs demi-ouvertes, d'un beau rose, et son labelle étroit.*

Comme tous les céphalanthères, ses fleurs ne s'ouvrent que timidement et elle passerait facilement inaperçue si elle n'arborait une si belle couleur rose à rouge. Ses hampes graciles bardées de feuilles raides comme des épées semblent monter la garde à l'orée des rares forêts qui la protègent encore.



20 à 50 cm

# CRÉPIS EN ROSETTE

*Crepis praemorsa*

Astéracées (= composées)



mai-juin




Photo Yves MARAIN

Ce crépis a une distribution géographique continentale en Europe et notre région constitue une limite occidentale pour cette espèce dont les graines ont besoin de froid pour germer. Plus que les plantes précédentes, elle affectionne les lisières des forêts claires et les bords de chemin.



20 à 40 cm

*Il se distingue des autres crépis par sa tige nue et ses feuilles toutes en rosette ; les fruits (akènes) ne portent pas de bec.*



RR

Espèce de l'Est, rare en France. Moins de 10 stations en Champagne-Ardenne (limite Ouest de répartition en France).



Lisières de hêtraies sur sols calcaires assez frais.




Espèce menacée par les défrichements des bois maigres et les reboisements des pelouses calcaires.



Une station est protégée par l'arrêté de protection de biotope du Cul-du-Cerf (52).





R

Espèce rare en plaine française, limitée aux plateaux jurassiques de Champagne-Ardenne et de Bourgogne.



Clairières, lisières, ourlets de pelouses sur calcaire dans notre région.



Espèce relativement menacée par le boisement naturel, la plantation de résineux, le traitement des lisières trop souvent labourées jusqu'à la forêt.



Plusieurs stations protégées par les arrêtés de protection de biotope du Cul-du-Cerf (52), Val-Clavin (52), pinède de Chaudrey (10).

# GENTIANE JAUNE

*Gentiana lutea*

Gentianacées



juin-juillet



Photo Vincent GILLET

*Cette grande plante ne présente aucune difficulté d'identification.*

La grande gentiane jaune, qui abonde dans les prairies pâturées et les prés-bois de la plupart de nos montagnes, est limitée en plaine aux plateaux jurassiques de la Haute-Marne, de l'Aube et de la Côte d'Or marqués par un climat qui lui convient bien : pluvieux et rigoureux en hiver.



60 à 150 cm